

CONSENTIMIENTO PARA ADMINISTRAR LA SEDACIÓN PARA TRATAMIENTO DENTAL

Algunos niños no pueden recibir tratamiento dental de la manera habitual debido a su corta edad, miedo, incapacidad para cooperar o la participación de los procedimientos. Las opciones para estos niños incluyen lo siguiente: (1) retrasar el tratamiento hasta que el niño coopere más, (2) restringir al niño para lograr la atención urgente que se requiera, (3) sedar al niño hasta un nivel en el que se pueda brindar cuidado dental cómodamente, o (4) dando al niño anestesia general en el hospital o centro de cirugía. Estas posibles opciones de tratamiento incluyen varias ventajas, desventajas y riesgos.

Retrasar el tratamiento puede permitir que la enfermedad dental progrese a una situación de emergencia, incluida la formación de abscesos, infección, dolor, fiebre y riesgo de desarrollar dientes permanentes, o contribuir a un problema dental a largo plazo. Restringir a un niño puede aumentar el temor al tratamiento dental, y la anestesia general puede afectar negativamente a algunos niños, sin mencionar sus riesgos. Los factores que se consideran cuando se administran sedantes incluyen historial médico, reacción previa a las drogas, edad, peso, comportamiento del niño y tratamiento a realizar. A pesar de tales consideraciones, la reacción del niño a las drogas sedantes varía de poco efecto a la sedación profunda. Las reacciones desfavorables a los medicamentos sedantes incluyen, pero no se limitan a, náuseas, vómitos, mareos, problemas respiratorios, reacciones alérgicas, coma y la muerte. Además del (los) medicamento (s) sedante (s), se puede usar óxido nitroso y oxígeno para complementar la sedación y administrar oxígeno. Los riesgos y complicaciones con el óxido nitroso son raros, y sus efectos desaparecen por completo cinco minutos después de que se detiene. Las complicaciones más comunes son náuseas y vómitos.

Se tomarán medidas adecuadas y aceptables para optimizar la seguridad de su hijo y para lograr una odontología pediátrica de calidad; sin embargo, no se le ofrecen garantías ni garantías de ningún tipo con respecto a los resultados que se pueden obtener. Estas medidas de seguridad pueden incluir el uso de un pedi-wrap para evitar movimientos inesperados y proporcionar a su hijo un entorno seguro. Además, se usará anestesia local para el control del dolor. Los riesgos que conlleva la anestesia local son los establecidos para los medicamentos sedantes.

Certifico que he leído y entiendo la información anterior y he tenido todas las preguntas relacionadas con los procedimientos, los riesgos importantes y las complicaciones respondidas a mi satisfacción. Con la firma de esta declaración, doy mi consentimiento informado y voluntario para administrar sedación consciente

Nombre del Paciente

Fecha de Nacimiento

Firma del Padre o Tutor

Fecha

Firma del Testigo

Fecha

Firma del Doctor

Fecha